



Børnesår: Meget smitsomme sår, der skyldes bakterier (primært stafylokokker eller streptokokker).

Om smitte: Smitte overføres med væske fra såret via hænder eller genstande. Smitte kan komme fra raske, der bærer bakterien i næsen.

Smitteperiode: Så længe sårene væsker, og så længe der er skorper.

Om forebyggelse: Et skærpet fokus på god hygiejne, og hyppig håndvask kan forebygge nye udbrud.

Symptomer Inkubationstid: Få dage. Sårene begynder oftest som en lille rød plet, der hurtigt udvikler sig til et væskende sår, der dækkes af gullige skorper. Sårene kan sidde overalt på huden, men er hyppigst omkring næse og mund. Spredning til andre i familien er hyppig.

Behandling: Børnesår kræver normalt lægebehandling.

Om forholdsregler ved sygdomstilfælde: Hvis der påvises MRSA i en prøve fra såret, gælder særlige regler, se under MRSA på sundhedsstyrelsens hjemmeside(www.sst.dk).

Komme i institution: Børnene må ikke komme i institution, før sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af. Selv om der er iværksat behandling, kan sårene godt smitte. Børn i skolealderen kan bedre overholde renlighed i form af håndhygiejne og må derfor komme i skole og institution, hvis sårene kan tildækkes, og hvis ikke sårene er meget udbredte. Instruktion i god hygiejne og hyppig håndvask kan forebygge nye udbrud.