



SMITSOMME SYGDOMME



Sygdom	Inkubationstid	Smitter fra	Smitter til	Komme i institution
Bylder	Få dage	Bylden begynder at væske	Bylden er tørret ind	Når bylden er tørret ind
Børneorm	2 – 6 uger	2 uger efter smitte	Behandling iværksat	Ingen begrænsninger
Børnesår	Få dage	Sårene begynder at væske	Sårene er tørret ind og skorperne faldet af	Når sårene er ophelede, dvs. tørre og skorperne faldet af
Diaré og opkastning	Oftest et par dage	Diarreens udbrud	Afføringen er normaliseret. Dog særlige forhold i tilfælde af roskildesygge VTEC og Shigella	Se under sygdommen *
Fnat	4 uger hos ikke tidligere smittede	Kort efter smittetidspunkt	Behandling iværksat	Når behandling er iværksat
Forkølelse og virushalsbetændelse	1 – 7 dage	1 døgn inden udbrud	5 døgn efter udbrud	Når barnet er rask og der ikke er pasningsproblemer
Forkølelæssår (herpes)	2 – 12 dage	Dannelse af blærer	Blærerne er tørret ind	Ingen begrænsninger, medmindre der er infektion i såret
Halsbetændelse- (bakteriel)	1 – 3 døgn	Barnet er smittet	Der er givet penicillin i 2 dage	Efter 2 dages penicillinbehandling, såfremt barnet er rask og feberfri
Hepatitis A (smitsom leverbetændelse)	3-6 uger	Sidste del af inkubationstiden	Få dage efter sygdomsudbrud	Når barnet er rask
Hepatitis B (leverbetændelse B)	2 – 4 mdr.	Se under sygdommen	Se under sygdommen	Når barnet er rask
Hånd, fod og mundsvædm (hand-foot and mouth disease)	5 – 7 dage	Udbrud af sygdommen	Udbrud er på retur	Når barnet er rask
Influenza	1 – 4 dage	1 døgn inden udbrud	Barnet er rask	Når barnet er rask
Kighoste	7 – 10 dage	7 – 10 dage efter barnet er smittet eller fra forkølelæssymptomerne er begyndt	6 uger efter de typiske hosteanfald er begyndt	Når hosteanfald ikke giver anledning til pasningsproblemer
Kysesyge (mononucleose)	4 – 7 uger	Udbrud af sygdommen	Barnet er rask	Når barnet er rask
Lus		Smittetidspunkt	Ingen levende lus	Når behandling er iværksat
Lussingsyge (femte børnesvædm)	Ca. 2 uger	En uge før udslættets udbrud	Udslættet er brudt ud	Når barnet er rask
Mellemørebetændelse med øreflåd	Komplikation til luftvejsinfektion	Kun i sjældnere tilfælde indeholder øreflåddet bakterier, der kan smitte andre		Afhænger af evt. smitterisiko og pasningsproblemer
Meningokoksygdom (smitsom meningitis)	1 – 4 dage	Kort før sygdomsudbrud	Et døgn efter behandlingen er iværksat	Når behandling er afsluttet og barnet er rask
MRSA				Se under sygdommen *
Mæslinger	10 dage	7 dage efter barnet er smittet eller fra forkølelæssymptomerne er begyndt	Indtil 4 dage efter udbrud af udslæt	Når barnet er rask
Røde hunde	2 – 3 uger	1 uge efter barnet er smittet eller 14 dage før udslættets udbrud	Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt	Når barnet er rask
Skoldkopper	2 – 3 uger	7 dage efter udsættelse eller 3 døgn før udslættets frembrud	5 dage efter udslættets frembrud eller indtil der ikke er fremkommet nye blærer i 2 dage og blærer er tørret ind	Når skorperne er tørret ind er smittefaren overstået
Skovflåtoverført borreliainfektion	3 – 30 dage			Når barnet er rask
Svampeinfektioner	Uger måneder	Udbrud af udslæt	Behandling iværksat	Ingen begrænsninger
TBE (flåtbåren hjernebetændelse)	7 – 14 dage			Når barnet er rask
Tredagesfeber	1-2 uger	Ukendt	Ukendt	Når barnet er rask
Vandvorter (moluscum contagiosum)	1 uge – 6 mdr.	Udbrud	Behandling iværksat	Ingen begrænsninger
Vorter	2-3 mdr	Udbrud	Behandling iværksat	Ingen begrænsninger. Fodvorter tilrådes dog tildækket
Øjenbetændelse	1 – 3 døgn	Svær form for øjenbetændelse smitter fra symptomer opstår	Svær form for øjenbetændelse smitter indtil der er givet behandling i mindst 2 døgn	Efter mindst 2 døgn behandling og symptomerne er forsvundet

* Se i bogen Smitsomme sygdomme hos børn og unge fra Sundhedsstyrelsen